



ALGORITMO DE ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DA URTICÁRIA EM URGÊNCIA



Algoritmo de tratamento da urticária em urgência



*Tabela com **Anti-histamínicos H1 de 2ª geração, não sedativos (anti-H1ns)** mais utilizados no tratamento da urticária (da dose *standard* até 4x/dia#)

Nome	Dose em adulto	Dose na criança (<i>standard</i>)
Levocetirizina#	5-20mg/dia	2-5 anos: 1,25mg/dia 6-12 anos: 2,5mg/dia >12 anos: 5mg/dia
cetirizina	10-40mg/dia	2-5 anos: 2,5mg/dia; 6-12 anos: 5mg/dia >12 anos: 10mg/dia
Desloratadina#	5-10mg/dia	1-5 anos: 1,25mg/dia 6-12 anos: 2,5mg/dia >12 anos: 5mg/dia
loratadina	10-40mg/dia	2-12 anos, ≤30Kg: 5mg/d; >30Kg: 10mg/dia >12 anos, >30Kg: 10mg/dia
Ebastina#	10-40mg/dia	2-5 anos: 2,5mg/dia 6-12 anos: 5mg/dia >12 anos: 10mg/dia
Bilastina#	20-80mg/dia	>12 anos: 20mg/dia
Rupatadina#	10-40mg/dia	2-12 anos, 10-25Kg: 2,5mg/dia; ≥25Kg: 5mg/dia >12 anos: 10mg/dia

com estudos de segurança na dose 4x/dia