



# ALGORITMO DE ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DA URTICÁRIA EM URGÊNCIA



# Algoritmo de tratamento da urticária em urgência



\*Tabela com Anti-histamínicos H1 de 2ª geração, não sedativos (anti-H1ns) mais utilizados no tratamento da urticária (da dose *standard* até 4x/dia#)

| Nome            | Dose em adulto | Dose na criança ( <i>standard</i> )                                         |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Levocetirizina# | 5-20mg/dia     | 2-5 anos: 1,25mg 2x/dia<br>6-12 anos: 5,0mg/dia<br>>12 anos: 5,0mg/dia      |
| Cetirizina      | 10-40mg/dia    | 2-5 anos: 2,5mg 2x/dia;<br>6-12 anos: 5,0mg 2x/dia<br>>12 anos: 10,0mg/dia  |
| Desloratadina#  | 5-20mg/dia     | 1-5 anos: 1,25mg/dia<br>6-12 anos: 2,5mg/dia<br>>12 anos: 5,0mg/dia         |
| Loratadina      | 10-40mg/dia    | 2-12 anos, ≤30Kg: 5,0mg/d; >30Kg: 10,0mg/dia<br>>12 anos, >30Kg: 10,0mg/dia |
| Ebastina#       | 10-40mg/dia    | 2-5 anos: 2,5mg/dia<br>6-12 anos: 5,0mg/dia<br>>12 anos: 10,0mg/dia         |
| Bilastina#      | 20-80mg/dia    | >12 anos: 20,0mg/dia                                                        |
| Rupatadina#     | 10-40mg/dia    | 2-12 anos, 10-25Kg: 2,5mg/dia; ≥25Kg: 5,0mg/dia<br>>12 anos: 10,0mg/dia     |

# com estudos publicados de segurança na dose 4x/dia no adulto